

ISSN 2224-526X

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ФЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

Х А Б А Р Л А Р Ы

ИЗВЕСТИЯ

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

АГРАРЛЫҚ ФЫЛЫМДАР СЕРИЯСЫ

◆
СЕРИЯ АГРАРНЫХ НАУК
◆

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES

2 (38)

НАУРЫЗ – СӘУІР 2017 ж.
МАРТ – АПРЕЛЬ 2017 г.
MARCH – APRIL 2017

2011 ЖЫЛДЫН ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 2011

ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Бас редактор

Есполов Т.И.,
э.ғ.д, профессор,
ҚР ҰҒА академигі және вице-президенті

Редакция алқасы:

Байзаков С.Б., э.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі (бас редактордың орынбасары); **Тиреуов К.М.**, э.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі (бас редактордың орынбасары); **Елешев Р.Е.**, т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; **Рай А.Г.**, т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; **Иванов Н.П.**, в.ғ.д, проф., ҚР ҰҒА академигі; **Кешуов С.А.**, т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі.; **Мелдебеков А.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; **Чоманов У.Ч.**, т.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА академигі; **Елюбаев С.З.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; **Садыкулов Т.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; **Сансызбай А.Р.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; **Умбетаев И.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; **Оспанов С.Р.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі; **Олейченко С.И.**, а.ш.ғ.д., проф.; **Кененбаев С.Б.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; **Омбаев А.М.**, а.ш.ғ.д., проф.; **Молдашев А.Б.**, э.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА құрметті мүшесі; **Сагитов А.О.**, б.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі; **Сапаров А.С.**, а.ш.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; **Балгабаев Н.Н.**, а.ш.ғ.д., проф.; **Умирзаков С.И.**, т.ғ.д, проф.; **Султанов А.А.**, в.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; **Жамбакин К.Ж.**, б.ғ.д., проф., ҚР ҰҒА корр-мүшесі; **Алимкулов Ж.С.**, т.ғ.д., проф., ҚР АШҒА академигі; **Саданов А.К.**, б.ғ.д., проф.; **Сарсембаева Н.Б.**, в.ғ.д., проф.

Редакция кеңесі:

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of Basel Switzerland; **Koolmees Petrus Adrianus**, Prof. Dr., Utrecht University, The Netherlands; **Babadoost-Kondri Mohammad**, Prof., University of Illinois, USA; **Yus Aniza Binti Yusof**, Dr., University Putra, Malayzия; **Hesseln Hayley Fawn**, As. Prof., University of Saskatchewan, Canada; **Alex Morgounov**, Pr., International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; **Андреш С.**, Молдова Республикасы ҰҒА академигі; **Гаврилюк Н.Н.**, Украина ҰҒА академигі; **Герасимович Л.С.**, Беларусь Республикасының ҰҒА академигі; **Мамедов Г.**, Азербайджан Республикасының ҰҒА академигі; **Шейко И.П.**, Беларусь Республикасының ҰҒА академигі; **Жалнин Э.В.**, т.ғ.д., проф., Ресей; **Боинчан Б.**, а.ш.ғ., проф., Молдова Республикасы.

Главный редактор

Есполов Т.И.,

доктор эконом. наук, проф.,
вице-президент и академик НАН РК

Редакционная коллегия:

Байзаков С.Б., доктор эконом. наук, проф., академик НАН РК (заместитель главного редактора); **Тиреуов К.М.**, доктор эконом. наук., проф., член-корр. НАН РК (заместитель главного редактора); **Елешев Р.Е.**, доктор техн. наук, проф., академик НАН РК; **Рау А.Г.**, доктор техн. наук, проф., академик НАН РК; **Иванов Н.П.**, доктор ветеринар. наук, проф., академик НАН РК; **Кешуов С.А.**, доктор техн. наук, проф., член-корр. НАН РК; **Мелдебеков А.**, доктор сельхоз. наук, проф., академик НАН РК; **Чоманов У.Ч.**, доктор техн. наук, проф., академик НАН РК; **Елюбаев С.З.**, доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. НАН РК; **Садыкулов Т.**, доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. НАН РК; **Умбетаев И.**, доктор сельхоз. наук, проф., член-корр. НАН РК; **Оспанов С.Р.**, доктор сельхоз. наук, проф., Почетный член НАН РК; **Олейченко С.И.**, доктор сельхоз. наук, проф.; **Кененбаев С.Б.**, доктор сельхоз. наук, проф., академик АСХН РК; **Омбаев А.М.**, доктор сельхоз. наук, проф.; **Молдашев А.Б.**, доктор эконом. наук, проф.. Почетный член НАН РК; **Сагитов А.О.**, доктор биол. наук, академик НАН РК; **Сапаров А.С.**, доктор сельхоз. наук, проф., академик АСХН РК; **Балгабаев Н.Н.**, доктор сельхоз. наук, проф.; **Умирзаков С.И.**, доктор техн. наук, проф.; **Султанов А.А.**, доктор ветеринар. наук, проф., академик АСХН РК; **Жамбакин К.Ж.**, доктор биол. наук, проф., член-корр. НАН РК; **Алимкулов Ж.С.**, доктор техн. наук, проф., академик АСХН РК; **Саданов А.К.**, доктор биол. наук, проф.; **Сарсембаева Н.Б.**, доктор ветеринар. наук, проф.

Редакционный совет:

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of asel Switzeland; **Koolmees Petrus Adrianus**, Prof. Dr., Utrecht University, The Netherlands; **Babadoost-Kondri Mohammad**, Prof., University of Illinois, USA; **Yus Aniza Binti Yusof**, Dr., University Putra, Malayzia; **Hesseln Hayley Fawn**, As.Prof., University of Saskatchewan, Canada; **Alex Morgounov**, Pr., International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; **Андреш С.**, академик НАН Республики Молдова; **Гаврилюк Н.Н.**, академик НАН Украины; **Герасимович Л.С.**, академик НАН Республики Беларусь; **Мамедов Г.**, академик НАН Республики Азербайджан; **Шейко И.П.**, академик НАН Республики Беларусь; **Жалнин Э.В.**, доктор техн. наук, проф., Россия; **Боинчан Б.**, доктор сельхоз. наук, проф., Республика Молдова.

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия аграрных наук.

ISSN 2224-526X

Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов Министерства культуры и информации Республики Казахстан № 10895-Ж, выданное 30.04.2010 г.

Периодичность 6 раз в год

Тираж: 300 экземпляров

Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219-220, тел. 272-13-19, 272-13-18
<http://nauka-nanrk.kz/agricultural.kz>

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2017

Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75

C h i e f E d i t o r

Espolov T.I.

Dr. economy. Sciences, prof.,
Vice President and member of the NAS RK

E d i t o r i a l B o a r d:

Baizakov S.B., Dr. of economy sciences, prof., academician of NAS RK (deputy editor); **Tireuov K.M.**, Doctor of Economy Sciences., prof., corresponding member of NAS RK (deputy editor); **Eleshev R.E.**, Dr. Of agricultural sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Rau A.G.**, Dr. sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Ivanov N.P.**, Dr. of veterinary sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Kesha S.A.**, Dr. sciences, prof., corresponding member. NAS RK; **Meldebekov A.**, doctor of agricultural sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Chomanov U.Ch.**, Dr. sciences, prof., academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Yelyubayev S.Z.**, Dr. of agricultural sciences, prof., corresponding member. NAS RK; **Sadykulov T.**, Dr. Farm. Sciences, prof., corresponding member. NAS RK; **Sansyzbai A.R.**, doctor of agricultural sciences, prof., corresponding member. NAS RK; **Umbetaev I.**, Dr. Farm. Sciences, prof., corresponding member. NAS RK; **Ospanov S.R.**, Dr. agricultural sciences, prof., Honorary Member of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Oleychenko S.N.**, Dr. Of agricultural sciences, prof.; **Kenenbayev S.B.**, Dr. Agricultural sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural Sciences of Kazakhstan; **Ombayev A.M.**, Dr. Agricultural sciences, Prof.; **Moldashev A.B.**, Doctor of Economy sciences, prof., Honorary Member of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Sagitov A.O.**, Dr. biol. sciences, Academician of the National Academy of Sciences of Kazakhstan; **Saparov A.S.**, Doctor of agricultural sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural Sciences of Kazakhstan; **Balgabaev N.N.**, the doctor agricultural sciences, Prof.; **Umirzakov S.I.**, Dr. Sci. Sciences, Prof.; **Sultanov A.A.**, Dr. of veterinary sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural Sciences of Kazakhstan; **Zhambakin K.J.**, Dr. of biological Sciences, prof., corresponding member of. NAS RK; **Alimkulov J.C.**, Dr. of biological sciences, prof., academician of the Academy of Agricultural sciences of Kazakhstan; **Sadanov A.K.**, Dr. of biological Sciences, Prof.; **Sarsembayeva N.B.**, Dr. veterinary sciences, prof.

E d i t o r i a l B o a r d:

Fasler-Kan Elizaveta, Dr., University of Basel Switzerland; **Koolmees Petrus Adrianus**, Prof. Dr., Utrecht University, The Netherlands; **Babadoost-Kondri Mohammad**, Prof., University of Illinois, USA; **Yus Aniza Binti Yusof**, Dr., University Putra, Malayzia; **Hesseln Hayley Fawn**, As. Prof., University of Saskatchewan, Canada; **Alex Morgounov**, candidate of agricultural sciences, International Maize and Wheat Improvement Center Turkey; **Andresh S.**, academician of NAS of Moldova; **Gavriluk N.N.**, academician of NAS of Ukraine; **Gerasimovich L.S.**, academician of NAS of Belorussia; **Mamadov G.**, academician of NAS of Azerbaijan; **Sheiko I.P.**, academician of NAS of Belorussia; **Zhalmin E.V.**, Dr. of technical sciences, professor, Russia, **Boinchan B.**, doctor of agricultural sciences, prof., Moldova.

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of Agrarian Sciences.

ISSN 2224-526X

Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)

The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of Information and Archives of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan N 10895-Ж, issued 30.04.2010

Periodicity: 6 times a year

Circulation: 300 copies

Editorial address: 28, Shevchenko str., of.219-220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
<http://nauka-nanrk.kz> / agricultural.kz

© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2017

Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES

ISSN 2224-526X

Volume 2, Number 38 (2017), 152 – 158

K. S. Nurgazy, K. N. Begembekov, U. A. Nuralieva, J. Tanzharyk

Kazakh national agrarian university, Almaty, Kazakhstan.
E-mail: nurgazy_k@bk.ru

BY MATING COWS KAZAKH WHITE BREED WITH HEREFORD BULLS

Abstract. It was found that when using bulls of the Kazakh white and Hereford breeds, do not differ both in the exterior, constitution and by live weight, precocity and other mainly of selected characteristics, in similar uteri Kazakh white breed held in the same economic conditions, their offspring were also characterized by similar figures on live weight, average daily gain and the economic efficiency of cultivation and their implementation at the age of 16 months as in the tribe, and the meat.

Key words: Kazakh Whitehead, Hereford breed, sire, purebred, crossbred progeny profitability.

УДК 636.082.11

К.Ш. Нургазы, К.Н. Бегембеков, У.А. Нуралиева, Ж. Танжарык

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан

РЕЗУЛЬТАТЫ СКРЕЩИВАНИЯ КОРОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ С ГЕРЕФОРДСКИМИ БЫКАМИ

Аннотация. Установлено, что при использовании быков-производителей казахской белоголовой и герефордской пород, практически не отличающихся как по экстерьеру, конституции, так и по живой массе, скороспелости и другим главным селекционируемым признакам, на аналогичных матках казахской белоголовой породы, проводимых в одинаковых хозяйственных условиях, их потомство также характеризуется сходными показателями по живой массе, среднесуточному приросту, экономической эффективности выращивания и их реализации в возрасте 16 месяцев как на племя, так и на мясо.

Ключевые слова: казахская белоголовая, герефордская, порода, бык-производитель, чистопородное, помесное потомство, рентабельность.

Введение. В комплексе селекционно-племенной работы с породой крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, основанного на традиционных методах их совершенствования – целенаправленном отборе, улучшающем подборе немаловажную роль играет межпородное скрещивание. Из числа разных методов скрещивания животных важное значение имеет вводное скрещивание коров местных пород с быками высокопродуктивных пород зарубежной селекции аналогичного направления продуктивности, по результатом которой можно будет решать ряд селекционных вопросов, что способствует улучшить некоторые хозяйственно-полезные особенности местного скота и закрепить их в ряде поколений.

По данным учета Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 01.01.2016 года в РК количество всего крупного рогатого скота составило 6 065,5 тысяч голов, из них племенное поголовье составило 652 198 голов или 10,8% (из них маточное поголовье 291 114 голов или 44,6%), в том числе племенные животные мясного направления – 393 033 голов или 60,3% от всего

племенного поголовья (из них маточное поголовье 178 422 голов или 45,4% от числа племенных животных мясного направления).

Из числа племенных животных мясного направления 223 994 голов или 57,0% (из них маточное поголовье 103 427 голов или 46,2%) животных относится к казахской белоголовой породе. А количество племенных животных герефордской породы по республике составляет всего лишь 39 489 голов (из них маточное поголовье 202 голов или 46,2%) или 17,6% от числа всех племенных животных мясного направления. [1].

Из этих данных можно увидеть несомненную актуальность увеличения численности и совершенствования продуктивных и племенных качеств казахской белоголовой породы скота в республике.

Материалы и методы исследований. Для эксперимента были отобраны по 2 (два) быка герефордской и казахской белоголовой пород 5-летнего возраста с одинаковой живой массой (907-915 кг), но типичные представители этих пород как по экстерьеру, конституции, так и другим видимым селекционируемым признакам, отвечающих требованиям класса элита-рекорд.

За каждым быком-производителем, подлежащему использованию для искусственного осеменения коров и получения потомства, по принципу аналогов закрепляли по 40 чистопородных коров казахской белоголовой породы (не являющихся его дочерьми) 4-летнего возраста, практически не отличающихся между собой как по экстерьеру, конституции, так и по живой массе (524-531 кг) и другим видимым селекционируемым признакам, отвечающих требованиям I класса.

С целью получения одновозрастных бычков и телочек были отобраны коровы, которые осеменялись в течение одного месяца. Самый оптимальный период проведения осеменения считалось – май-июнь месяцы. Проведение осеменения в эти месяцы дали возможность провести испытание бычков в стойловый период, лучших из них, выявленных на основе испытания по собственной продуктивности,пустить в случку и уже в следующем году оценить по качеству потомства. При такой системе быки-производители к 3-3,5 летнему возрасту пройдут двухэтапную генотипическую оценку по собственной продуктивности и качеству потомства.

В настоящей работе приводятся результаты скрещивания и изучения помесного потомства I поколения ($\text{♀КБ} \times \text{♂Г}$) в сравнительном аспекте с их чистопородными ($\text{♀КБ} \times \text{♂КБ}$) сверстниками до 16 месячного возраста.

Полученные телята до 8 месячного возраста выращивались совместно с коровами на полном подсосе. После отъема телят от коров отбирали по 15 нормально развитых бычков от каждого использованного быка-производителя и переводили в оборудованное секциями помещение с наличием индивидуальных клеток позволяющих их раздельно кормить и вести учет поедаемости кормов. Рядом с этим помещением были выгульные дворы, где также организовывались кормление и поение бычков.

Интенсивное выращивание во время испытания бычков по собственной продуктивности проводились до 16-месячного возраста. Уровень и рацион кормления испытываемых бычков составляли из расчета, чтобы к концу испытательного периода живая масса испытываемых бычков была не ниже требований класса элита-рекорд.

С целью получения достоверных данных о мясных качествах потомства, испытываемых бычков выращивали в оптимальных и совершенно одинаковых условиях кормления и содержания, для сопоставления полученных результатов в пределах одного хозяйства.

В рацион кормления включены качественные корма – сено, сенаж и концентрированные корма с удельным весом, соответственно по 20-25 % грубых и сочных кормов и 50 % концентратов от общей питательности. Для поения бычков использовали групповые поилки, в холодный период года – с подогревом воды.

Изучение показателей подопытных бычков проводили по общепринятым методикам. Результаты проведенных сравнительных исследований опытной и контрольной групп и испытания бычков по собственной продуктивности, полученные при контролльном выращивании бычков использованных быков-производителей, являлись основанием для анализа результативности вариантов подбора родительских пар.

В общепринятой системе изучения результатов скрещивания, основными селекционными признаками, в значительной мере определяющие хозяйственную ценность и результатирующую

величину мясной продуктивности чистопородного (контрольная – I группа) и помесного (опытная – II группа) потомства были – живая масса и среднесуточный прирост.

Результаты и обсуждение. Наследственные свойства скота могут достаточно полно проявиться только в благоприятных условиях внешней среды. Молодой организм обладает большой пластичностью. Поэтому факторами кормления и содержания воздействует на формирование продуктивных и племенных качеств скота, улучшая их. При этом основываются на закономерностях роста и развития животных данного вида [2].

Теорией и практикой установлено преимущество генотипов казахской белоголовой породы с высокими показателями живой массы в разном, особенно, в молодом возрасте.

Поэтому племенная работа с казахской белоголовой породой мясного скота ориентирована в основном на высокие показатели среднесуточного прироста в разные возрастные периоды их роста и развития [3].

Наряду с этим, важное значение в совершенствовании казахской белоголовой породы приобретает использование разнообразия среди потомства разных по генотипу быков-производителей [4].

Объективная оценка генетического потенциала и повышение точности отбора ремонтного молодняка для воспроизводства стада – залог эффективной селекционно-племенной работы в мясном скотоводстве [5].

Поэтому целью наших исследований было определение влияния разных генотипов быков-отцов на качество потомства, путем использования в эксперименте быков-производителей казахской белоголовой и герефордской пород, практически не отличающихся как по экстерьеру, конституции, так и по живой массе, скороспелости и другим видимым селекционируемым признакам, проводимых в одинаковых хозяйственных условиях.

Эксперимент по скрещиванию коров казахской белоголовой (КБ) породы скота с быками герефордской (Г) породы (опытная группа) проведен в сравнительном аспекте с контрольной группой где были использованы чистопородные быки и коровы казахской белоголовой породы. Полученное потомство исследовали по признакам мясной продуктивности до 16 месячного возраста (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика роста молодняка разных генотипов испытанного в условиях доращивания, откорма и нагула

Порода, породность	n, голов	Параметры, един. измер.	Живая масса в возрасте, мес.			Среднесуточный прирост (г) за период, мес.		
			8	12	16	8-12	12-16	8-16
КБ	29	\bar{X} , кг	228,7	312,0	422,2	694	918	806
		m_x , кг	6,97	9,81	13,61	16,7	14,6	11,2
		C_v , %	16,1	16,7	17,1	12,7	8,4	7,5
F_1 (♀КБх♂Г)	28	\bar{X} , кг	235,2	322,0	430,1	723	900	812
		m_x , кг	6,96	9,79	13,41	15,7	20,5	12,3
		C_v , %	15,9	16,4	16,8	11,7	12,3	8,0
В среднем	57	\bar{X} , кг	232,0	317,1	426,2	709	909	809
		m_x , кг	3,12	4,56	6,41	8,64	12,16	7,3
		C_v , %	10,2	10,9	11,4	9,2	10,1	6,8
Средний (\bar{X}) показатель F_1 от КБ (100%) в %			102,8	103,2	101,8	104,2	98,03	100,7

Как видно из данных таблицы 1, где приведены результаты изучения динамики роста чистопородных (КБ) и помесных бычков I поколения (F_1) разных генотипов ($\text{♀КБ} \times \text{♂Г}$) испытанного в условиях доращивания, нагула и откорма, в целом, показатели живой массы и среднесуточного прироста за отдельные периоды роста и развития помесных бычков I поколения, в основном, выше, чем аналогичные показатели чистопородных сверстников. Так, например, бычки-помеси I поколения, полученные от маток казахской белоголовой породы и быков герефордской породы, по живой массе в возрасте 8 месяцев превосходили чистопородных сверстников на 7,5 кг или 3,3%

($t_d = 0,76$; $P < 0,95$). Но эти разницы очень малы, что указывает на слабое проявления явления гетерозиса по данным признакам.

Эта тенденция сохранилась и в последующие возрастные периоды бычков-потомков от разных по генотипу производителей, а межгрупповые различия при этом значительно увеличились. Так, превосходство по живой массе в 12 месяцев бычков-помесей от быков-производителей герефордской породы над чистопородными сверстниками составило 10,0 кг или 3,2%; ($t_d = 0,72$; $P < 0,95$).

А в возрасте 16 месяцев превосходство по живой массе бычков-помесей от быков-производителей герефордской породы над чистопородными сверстниками от быков-производителей казахской белоголовой породы составляло 7,9 кг или 1,9%; ($t_d = 0,41$; $P < 0,95$).

Различия животных разных генотипов в разные возрастные периоды их роста и развития обуславливали и различию по среднесуточному приросту за соответствующие периоды их онтогенеза. Так, по данному показателю помеси от герефордских быков превосходили чистопородных сверстников казахской белоголовой породы в период с 8 месяцев по 12 месяцев на 29 г или 4,2% ($t_d = 1,26$; $P < 0,95$), а в период с 12 по 16 месяцев наоборот – по среднесуточному приросту преимущество было у чистопородных сверстников казахской белоголовой породы 18 г или 2,0% ($t_d = 0,72$; $P < 0,95$). И в целом, по среднесуточному приросту в период с 8 месяцев по 16 месяцев помеси от герефордских быков превосходили чистопородных сверстников казахской белоголовой породы на 6 г или 0,7% ($t_d = 0,37$; $P < 0,95$).

Экстерьерные показатели потомства, полученные как от быков-производителей герефордской, так и от быков-производителей казахской белоголовой пород, можно считать оптимальными и вполне соответствующими для животных высших бонитировочных классов. Все потомки были высокорослыми животными с хорошо выраженным мясными формами, крепкой конституцией.

Таким образом, межгрупповые разницы по живой массе, среднесуточному приросту и экстерьерным показателям бычков в разные возрастные периоды их роста и развития очень малы, что указывает на слабое проявление явления гетерозиса у помесей по данному признаку.

Указанные факты можно объяснить отсутствием различий по живой массе использованных быков-отцов сравниваемых сверстниц-потомков, как и было предусмотрена методикой исследования.

Исходя из этого можно заключить, что при использовании на матках казахской белоголовой породы скота с одинаковой живой массой, быков-производителей казахской белоголовой и герефордской пород одного возраста (5 летние) также с одинаковыми между собой показателями живой массы, полученные потомки также будут характеризоваться практически одинаковыми показателями живой массы.

В процессе совершенствования широко распространенных популяций мясного скота первостепенное значение имеет эффективность использования разных вариантов подбора скрещиваемых пород. При этом степень эффективности влияния на помесное потомство обусловлена как генетическим потенциалом производителей, так и коров, к которым был осуществлен подбор конкретного быка.

Известно, что генетическое разнообразие каждой породы, типа или стада дает основу для успешной селекционной работы. И при любом варианте скрещивания сельскохозяйственных животных несомненно улучшается генотип потомства, обогащаясь наследственными факторами исходных пород. Это, в свою очередь, отдаляет угрозу фенотипического проявления нежелательных признаков у потомства этих животных с возможным накоплением нежелательных аллелей, которые часто проявляются при длительном чистопородном разведении породы сельскохозяйственных животных.

По результатам изучения технологии выращивания молодняка старше 8 месяцев и динамики роста животных разных генотипов в одинаковых хозяйственных условиях можно констатировать следующие аспекты.

При устойчивой кормовой базе целесообразно практиковать выращивание телок со среднесуточным приростом 750-800 г.

В зимнее время наиболее целесообразно беспривязное содержание молодняка на глубокой подстилке, телок – по 150-200, бычков – по 25-30 голов в группе. Кормили животных на выгульно-

кормовых площадках. В расчете на 1 голову должно приходится 5 квадратных метра помещения и 15-20 квадратных метра выгульно-кормовой площадки.

В летний период телок выпасали на естественных пастбищах с подкормкой концентрированными кормами в период выгорания трав. Высокая интенсивность выращивания позволяет получать к 13-14 месячному возрасту телок живой массой 350-360 кг и проводить раннюю случку.

При выращивании бычков среднесуточные приrostы с 8 до 12 месяцев составляли в среднем 709 г, а с 12 до 16 месяцев – 909 г. Это позволяет использовать их для воспроизводства в более раннем возрасте.

При кормлении бычков в зимний период использовали рационы, в состав которых входят сена 20 - 35%, сочных кормов – 20 - 30% и концентрированных кормов – 45-50% (по питательности).

В летний период их содержали на пастбище с подкормкой концентратами (по 2-3 кг на 1 голову в сутки).

При выращивании быков-производителей надо добиваться, чтобы они в нормальные физиологические сроки имели хорошие репродуктивные качества. Наступление половой зрелости и продолжительность использования производителей в значительной степени зависит от условий кормления. Полноценное кормление способствует хорошему развитию животных, при этом быков можно использовать для воспроизводства стада с 18 месячного возраста [6].

Экономический анализ выращивания и реализации молодняка от быков разных пород на племя показало, что в расчете на 1 голову бычка-потомка (таблица 2) в возрасте 16 месяцев чистая прибыль составила в пределах 433 860 – 444 130 тенге.

Таблица 2 – Расчет экономической эффективности выращивания и реализации молодняка разных генотипов в 16 месячном возрасте как племенные бычки

Показатель	Порода, породность		В среднем
	КБ ($\text{♀КБ} \times \text{♂КБ}$)	$F_1 (\text{♀КБ} \times \text{♂Г})$	
Живая масса 1 бычка, кг	422,2	430,1	426,2
Реализационная стоимость бычка по живой массе, тенге/кг	1300	1300	1300
Выручка от реализации 1 бычка, тенге	548 860	559 130	554 060
Себестоимость 1 бычка, тенге	115 000	115 000	115 000
Чистая прибыль, тенге	433 860	444 130	439 060
Рентабельность, %	377,3	386,2	381,8
Сравнительная экономическая эффективность	тенге	–	10 270
	%	100	102,4
			101,2

При этом, по количеству чистой прибыли в расчете на 1 голову помесные бычки-потомки I поколения (F_1) от быков-производителей герефордской породы превосходили чистопородных сверстников-потомков от быков-производителей казахской белоголовой породы на 10 270 тенге или на 2,4%.

Чистая прибыль и уровень рентабельности выращивания и реализации молодняка разных генотипов в 16 месячном возрасте была очень высока: от продажи бычков на племя (таблица 2) оно составило 433 860-444 130 тенге и 352,6-444,8%, соответственно, от продажи молодняка по приросту живой массы с 8 до 16 месяцев (таблица 3) составляло – 193 500-194 100 тенге и 333,3%, а от продажи молодняка на мясо (таблица 4) из расчета выхода чистого мяса бычков в 16 месяцев в пределах 55%, оно составляло – 211 100-236 600 тенге и 250%.

Результаты настоящих исследований согласуется с теоретическими и практическими результатами многих научных исследований по изучению разных методов совершенствования пород сельскохозяйственных животных.

Выводы. Установлено, что при использовании быков-производителей казахской белоголовой и герефордской пород, практически не отличающихся как по экстерерьеру, конституции, так и по живой массе, скороспелости и другим видимым селекционируемым признакам, на аналогичных матках казахской белоголовой породы, проводимых в одинаковых хозяйственных условиях, их потомство также характеризовалось сходными показателями по живой массе, среднесуточному

Таблица 3 – Расчет экономической эффективности выращивания молодняка разных генотипов по приросту их живой массы с 8 до 16 месяцев

Показатель	Порода, породность молодняка		
	КБ ($\text{♀КБ} \times \text{♂КБ}$)	$F_1 (\text{♀КБ} \times \text{♂Г})$	В среднем
Живая масса 1 бычка в 8 мес, кг	228,7	235,2	232,0
Живая масса 1 бычка в 16 мес, кг	422,2	430,1	426,2
Прирост живой массы (пжм), кг	193,5	194,1	194,2
Себестоимость 1 кг пжм, тенге		300	
Себестоимость всего пжм, тенге	58 050	58 230	58 260
Реализационная цена 1 кг пжм, тенге		1300	
Выручка от реализации по пжм, тенге	251 550	252 330	252 460
Чистая прибыль, тенге	193 500	194 100	194 200
Рентабельность, %		333,3	
Сравнительная экономическая эффективность	тенге	–	700
	%	100	100,4

Таблица 4 – Экономическая эффективность выращивания молодняка и реализации их на мясо в 16 месяцев

Показатель	Порода, породность молодняка		
	КБ ($\text{♀КБ} \times \text{♂КБ}$)	$F_1 (\text{♀КБ} \times \text{♂Г})$	В среднем
Живая масса 1 бычка, кг	422,2	430,1	426,2
Выход чистого мяса (55%), кг	211,1	236,6	234,4
Себестоимость 1 кг мяса, тенге		400	
Себестоимость всего мяса, тенге	84 440	94 640	93 760
Реализационная цена 1 кг мяса, тенге		1400	
Выручка от реализации мяса, тенге	295 540	331 240	328 160
Чистая прибыль, тенге	211 100	236 600	234 400
Рентабельность, %		250	
Сравнительная экономическая эффективность	тенге	–	23 300
	%	100	111,0

приросту и экономической эффективности выращивания и их реализации в возрасте 16 месяцев как на племя, так и на мясо.

С экономической точки зрения, выращивание и реализация как чистопородного молодняка казахской белоголовой породы, так и помесей I поколения (F_1), полученного от герефордских быков, как на племя, так и на мясо оказались высокоприбыльным делом, что указывает на достаточно высокую целесообразность широкого внедрения этого метода в производство в разных регионах, где разводятся указанные породы мясного крупного рогатого скота.

Таким образом, в целях получения высокопродуктивного мясного молодняка, не уступающим чистопородным сверстникам в стадах казахской белоголовой породы, достаточно будет использование в межпородном скрещивании быков герефордской породы, практически не отличающихся как по экстерьеру, конституции, так и по живой массе, скороспелости и другим видимым селекционируемым признакам от быков казахской белоголовой породы, проводимых в одинаковых хозяйственных условиях.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Статистические данные Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 01.01.2016 года. <http://mgov.kz/>.
- [2] Тореханов А.А., Бегембеков К.Н., Нургазы А.К. Современная система племенного дела в скотоводстве. – Алматы: Эверо, 2015. – 292 с.

- [3] Нургазы К.Ш., Кайруллаев К.К., Кулманова Г.А., Нургазы Б.О., Турганбаева Ф.А. Рост и развитие молодняка мясных пород крупного рогатого скота разных генотипов в условиях Южного Прибалхашья // Вестник государственного университета им. Шакарима. – Семей, 2016. – № 1. – С. 193-195.
- [4] Бозымов К.К., Абжанов Р.К., Ахметалиева А.Б., Востриков Н.И. Высокопродуктивные новые заводские линии скота казахской белоголовой породы // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 33, № 1-1. – С. 128-130.
- [5] Нургазы К.Ш., Кайруллаев К.К., Кулманова Г.А., Нургазы Б.О., Турганбаева Ф.А. Воспроизводительная способность крупного рогатого скота мясных пород в условиях песчаных пустынь Южного Прибалхашья // Материалы международной конференции «Актуальные проблемы развития современной науки». – Киев, 30 марта 2016 г. – № 2 часть. – С. 68-73.
- [6] Тореханов А.А., Карымсаков Т.Н., Бегембеков К.Н., Баккожаев А.А. Современные аспекты племенной работы в скотоводстве. – Астана: Агротехуниверситет, 2012. – 203 с.

REFERENCES

- [1] Statisticheskie dannye Ministerstva sel'skogo hozjajstva Respubliki Kazahstan na 01.01.2016 goda. <http://mgov.kz/>.
- [2] Torehanov A.A., Begembekov K.N., Nurgazy A.K. Sovremennaja sistema plemennogo dela v skotovodstve. Almaty: Jevero, 2015. 292 p.
- [3] Nurgazy K.Sh., Kajrullaev K.K., Kulmanova G.A., Nurgazy B.O., Turganbaeva F.A. Rost i razvitiye molodnjaka mjasnyh porod krupnogo rogatogo skota raznyh genotipov v uslovijah Juzhnogo Pribalhash'ja // Vestnik gosudarstvennogo universiteta imeni Shakarima. Semej, 2016. N 1. P. 193-195.
- [4] Bozymov K.K., Abzhanov R.K., Ahmetaliева A.B., Vostrikov N.I. Vysokoproduktivnye novye zavodskie linii skota kazahskoj belogolovoj porody // Izvestija Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2012. Vol. 33, N 1-1. P. 128-130.
- [5] Nurgazy K.Sh., Kajrullaev K.K., Kulmanova G.A., Nurgazy B.O., Turganbaeva F.A. Vospriozvoditel'naja sposobnost' krupnogo rogatogo skota mjasnyh porod v uslovijah peschanyh pustyn' Juzhnogo Pribalhash'ja // Materialy mezhdunarodnoj konferencii «Aktual'nye problemy razvitiya sovremennoj nauki». Kiev, 30 marta 2016 g. N 2 chast'. P. 68-73.
- [6] Torehanov A.A., Karymsakov T.N., Begembekov K.N., Bakkozaev A.A. Sovremennye aspekty plemennoj raboty v skotovodstve. Astana: Agrotehuniversitet, 2012. 203 p.

Қ. Ш. Нұрғазы, Қ. Н. Бегімбеков, Ұ. А. Нұралиева, Ж. Таңжарық

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан

ҚАЗАҚТЫҢ АҚБАС ТҮҚЫМДЫ СИҮРЛАРЫН ГЕРЕФОРД БҮҚАЛАРЫМЕН БУДАНДАСТЫРУ НӘТИЖЕЛЕРИ

Аннотация. Экстеръері, конституциясы, тірілей салмағы, тезжетілгіштігі және басқа негізгі селекциялық белгілері бойынша өзара айырмашылығы аз қазақтың ақбас және герефорд түқымды бұқалармен қазақтың ақбас сиүрларын ұрықтандырғанда алынған ұрпак та тірілей салмағы, тәуліктік салмақ косусы және 16 айлығына дейін есірудің экономикалық тиімділігі бойынша өзара ұқсас көрсеткіштермен сипатталатыны анықталды.

Түйін сөздер: қазақтың ақбас, герефорд түқымы, аталық-бұқалар, таза түқымды, будан ұрпак, рентабельділік.

Сведения об авторах:

Нургазы К.Ш. – доктор с.х.наук., профессор; НАО «Казахский национальный аграрный университет», nurgazy_k@bk.ru

Бегембеков К.Н. – доктор с.х.наук., НАО «Казахский национальный аграрный университет», b_kyrgyzbay@mail.ru

Нуралиева У.А. – канд. с.х.наук., НАО «Казахский национальный аграрный университет», nua.ulgan@mail.ru

Танжарық Ж. – магистрант; пр. Абая, 8, НАО «Казахский национальный аграрный университет», zhaidar88@mail.ru

Publication Ethics and Publication Malpractice in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication see <http://www.elsevier.com/publishingethics> and <http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics>.

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see <http://www.elsevier.com/postingpolicy>), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, including electronically without the written consent of the copyright-holder. In particular, translations into English of papers already published in another language are not accepted.

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the Cross Check originality detection service <http://www.elsevier.com/editors/plagdetect>.

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly contributed to the research.

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the research funders.

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan.

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor and safeguard publishing ethics.

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:

www.nauka-nanrk.kz

<http://agricultural.kz/>

Редактор М. С. Ахметова, Д. С. Аленов, Т. М. Апендиев
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой

Подписано в печать 18.04.2017.
Формат 60x881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф.
17,5 п.л. Тираж 300. Заказ 1.